



1年に2回以上、中耳炎にかかる。

## 10の徴候（成人版）

# IEI\*



原発性免疫不全症候群を疑う家族歴がある。



1年に2回以上重症副鼻腔炎を繰り返す。

## 原発性免疫不全症候群 （指定難病65）

\*IEI: Inborn Errors of Immunity. 従来、Primary Immunodeficiencies (PID)とも呼ばれてきた

原発性免疫不全症候群は小児だけの病気ではありません。  
成人でも、これらの所見のうち2つ以上当てはまる場合は、**原発性免疫不全症の可能性がないか専門の医師にご相談ください。**


日本免疫不全・自己炎症学会（JSIAD）はこちら



<https://jsiad.org>

日本免疫不全・自己炎症学会：日本語版原発性免疫不全症を疑う10の徴候（成人用）より改変

お問い合わせ：[medinfo.jp@pharming.com](mailto:medinfo.jp@pharming.com)




反復性または重症ウイルス感染症（ヘルペス、EBウイルス感染症、サイトメガロウイルス感染症、広範囲のいぼ、コンジローマなど）をくりかえす。




2年以上1年に1回以上肺炎にかかる。



2回以上、髄膜炎、骨髄炎、蜂窩織炎、敗血症や、皮下膿瘍、臓器内膿瘍などの深部感染症にかかる。



非結核性抗酸菌感染症への罹患。



経静脈投与を要する感染症の反復。



体重減少を伴う慢性下痢症。



持続性の驚口瘡や皮膚真菌症がみられる。